



Morbillo & Rosolia *News*

N. 75 – Agosto 2024


La sorveglianza epidemiologica nazionale del morbillo e della rosolia è coordinata dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Reparto Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici e Laboratorio Nazionale di riferimento per il Morbillo e la Rosolia con il contributo della rete nazionale di Laboratori Regionali di Riferimento ([MoRoNet](#)). La piattaforma della sorveglianza è accessibile al seguente link: morbillo.iss.it.

Il presente bollettino mostra l'andamento dei casi di morbillo segnalati in Italia da gennaio 2023 e descrive la distribuzione e le caratteristiche dei casi di morbillo e di rosolia segnalati dal **01/01/2024** al **31/07/2024** (data estrazione dei dati 07/08/2024).

Morbillo

La **Figura 1** e la **Tabella 1** riportano la distribuzione dei casi di morbillo notificati in Italia, per mese di inizio sintomi, da gennaio 2023 a luglio 2024. Dopo un periodo di bassa incidenza fino ad agosto 2023, si osserva un aumento graduale del numero di casi segnalati, con un picco di 180 casi nel mese di aprile 2024. Il numero di segnalazioni è diminuito nei mesi successivi, con 89 casi segnalati nel mese di luglio 2024.

Figura 1. Numero casi di morbillo (possibili, probabili e confermati) notificati, per mese di inizio sintomi: Italia 01/01/2023 – 31/07/2024.



* dati provvisori

Tabella 1. Numero casi di morbillo (possibili, probabili e confermati) notificati, per mese di inizio sintomi: Italia 01/01/2023 – 31/07/2024.

Anno	Mese	Casi di morbillo			
		Possibili	Probabili	Confermati	Totale
2023	gen			1	1
	feb			1	1
	mar	2			2
	apr			1	1
	mag			1	1
	giu			1	1
	lug			1	1
	ago			3	3
	set			8	8
	ott			3	3
	nov			7	8
	dic	1		13	14
2024	gen		1	33	34
	feb	8	1	87	96
	mar	8	5	112	125
	apr	23	9	148	180
	mag	8	2	121	131
	giu	5	2	145	152
	lug*	5	4	80	89

* dati provvisori

Dal **01/01/2024** al **31/07/2024** sono stati notificati **807** casi di morbillo, di cui 726 (90,0%) confermati in laboratorio, 24 probabili e 57 casi possibili (**Tabella 1**). Cinquantacinque (6,7%) dei casi segnalati nel periodo sono casi importati.

La **Tabella 2** mostra il numero di casi di morbillo segnalati per mese di inizio sintomi e Regione di segnalazione, e l'incidenza (per milione di abitanti) totale e per Regione.


Diciassette Regioni/PPAA hanno segnalato casi, di cui sei (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) hanno segnalato complessivamente l'82,3% dei casi (664/807). L'incidenza più elevata è stata osservata nella Regione Lazio (55,4/milione abitanti) seguita dall'Abruzzo (55,3/milione abitanti), dall'Emilia-Romagna (51,2/milione) e dalla Sicilia (46,5/milione). A livello nazionale, l'incidenza nel periodo è stata pari a 23,5 casi per milione di abitanti.

Tabella 2. Numero di casi di morbillo segnalati per mese di insorgenza sintomi e Regione, e incidenza per Regione, Italia 01/01/2024 - 31/07/2024.

Regione	Mese di insorgenza sintomi												Totale	Incidenza x 1.000.000
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
<i>Piemonte</i>		3	1	2									6	2,4
<i>Valle d'Aosta</i>													0	0,0
<i>Lombardia</i>	5	2	9	6	21	34	16						93	15,9
<i>P.A. di Bolzano</i>		1	3										4	12,8
<i>P.A. di Trento</i>													0	0,0
<i>Veneto</i>	1	4	8	2	4	2	1						22	7,8
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>			2	5		1	1						9	12,9
<i>Liguria</i>		2	8	6	4	10	5						35	39,8
<i>Emilia-Romagna</i>	3	4	21	33	39	30	3						133	51,2
<i>Toscana</i>	7	24	5	3	3	6							48	22,5
<i>Umbria</i>													0	0,0
<i>Marche</i>	1		2	1	3	7							14	16,2
<i>Lazio</i>	7	24	36	45	33	18	22						185	55,4
<i>Abruzzo</i>		1	5	20	13	2							41	55,3
<i>Molise</i>													0	0,0
<i>Campania</i>	5	3	2	12	6	28	19						75	23,0
<i>Puglia</i>		1		1			3						5	2,2
<i>Basilicata</i>				1									1	3,2
<i>Calabria</i>			2		1	2							5	4,7
<i>Sicilia</i>	5	27	21	43	4	11	19						130	46,5
<i>Sardegna</i>						1							1	1,1
TOTALE	34	96	125	180	131	152	89	0	0	0	0	0	807	23,5


La **Figura 2** riporta la distribuzione dei casi e l'incidenza per classe di età. L'età mediana dei casi segnalati è pari a 31 anni (range: 0 - 73 anni). Oltre la metà dei casi (52,6%) ha un'età compresa tra 15 e 39 anni e un ulteriore 23,9% ha più di 40 anni di età. Tuttavia, l'incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni (90,4 casi per milione). Sono stati segnalati 38 casi in bambini con meno di un anno di età.

Figura 2. Distribuzione (%) e incidenza (per milione di abitanti) dei casi di morbillo notificati in Italia per classe di età, 01/01/2024 - 31/07/2024 (n=807).



Lo stato vaccinale è noto per 756 casi dei 807 segnalati (93,7%), di cui 679 casi (89,8%) erano non vaccinati al momento del contagio, 39 casi (5,2%) erano vaccinati con una sola dose, e 29 casi (3,8%) erano vaccinati con due dosi. Per i rimanenti nove casi (1,2%) non era noto il numero di dosi effettuate. Duecentosessantotto casi (33,2%) hanno riportato almeno una complicanza. Le complicanze più frequentemente riportate sono state epatite/aumento delle transaminasi (n=128) e polmonite (n=99) (**Figura 3**). È stato segnalato un caso di encefalite in un giovane adulto, non vaccinato.

Figura 3. Complicanze più frequentemente riportate tra i casi di morbillo segnalati, e percentuale di casi che hanno riportato ogni complicanza. Italia, 01/01/2024 - 31/07/2024 (n=513).



Per il 49,1% dei casi (396/807) viene riportato un ricovero e per ulteriori 151 casi una visita in Pronto Soccorso.

L'informazione sull'ambito di trasmissione è nota per il 38,0% dei casi segnalati. La trasmissione è avvenuta principalmente in ambito familiare (n=123). Settantadue casi si sono verificati a seguito di trasmissione in ambito sanitario (nosocomiale o ambulatorio medico), 37 hanno acquisito l'infezione in ambito lavorativo (non medico), 23 casi durante viaggi internazionali e 18 casi in ambito scolastico.

Tra i casi segnalati, 65 sono operatori sanitari, di cui 47 non vaccinati.

Il 42,4% dei casi di morbillo confermati in laboratorio sono stati genotipizzati (308/726) e mostrano la seguente distribuzione: 299 casi con genotipo D8, 8 casi con B3 e 1 caso con genotipo D4.

Rosolia

Nel periodo 01/01/2024 - 31/07/2024, in Italia, sono stati segnalati due casi di rosolia (classificati come possibili).

Commento

Dal 2023, sono in corso aumenti significativi del numero di casi e di epidemie di morbillo nel mondo, inclusa l'Europa e l'Italia. Nella Regione Europea dell'OMS sono stati segnalati, nel periodo da luglio 2023 a luglio 2024, 132.977 casi di morbillo, di cui quasi il 90% da cinque Paesi: Kazakistan (40.525 casi), Azerbaijan (30.346), Federazione Russa (20.949), Kirgizstan (17.953) e Romania (8.596). Tra i primi dieci Paesi della Regione per numero di casi riportati nel periodo, è presente anche l'Italia, al decimo posto.

In Italia, i recenti aumenti nell'incidenza del morbillo, a partire da agosto 2023, sono dovuti a diversi fattori, tra cui la copertura vaccinale (CV) per due dosi inferiore al 95%, l'importazione di casi da aree geografiche con elevata circolazione del virus, e la tipica stagionalità del morbillo che presenta un picco d'incidenza nel tardo inverno e in primavera. Nel mese di luglio si osserva un dimezzamento del numero di casi segnalati rispetto al picco osservato ad aprile 2024. Tuttavia, non si esclude che si possa verificare un nuovo aumento di casi nei mesi prossimi, dovuto a nuove importazioni, dopo i viaggi estivi. Il virus del morbillo è estremamente contagioso e può rimanere infettivo nell'aria e sulle superfici infette fino a due ore; inoltre, la contagiosità inizia circa quattro giorni prima della comparsa dei sintomi. Vaccinarsi è l'unico modo per proteggersi dal morbillo e dalle sue complicanze che possono essere gravi (es. polmonite in un caso su 20, encefalite in un caso su 1.000, 1-2 decessi ogni 1.000 casi di morbillo). Due dosi di vaccino hanno una efficacia di circa il 97%.

La maggior parte dei casi di morbillo segnalati in Italia da gennaio 2024, si è verificata in persone non vaccinate o vaccinate con una sola dose, e oltre la metà dei casi sono adolescenti e giovani adulti. Tuttavia, l'incidenza più elevata viene osservata nei bambini sotto i cinque anni di età. Continuano ad essere segnalati, inoltre, anche casi in bambini sotto l'anno, troppo piccoli per essere vaccinati, e che pertanto dipendono dall'immunità di popolazione per essere protetti dal morbillo. Preoccupano anche i casi tra operatori sanitari e la trasmissione in ambito sanitario/nosocomiale. Come atteso, sono state riportate complicanze in oltre il 30% dei casi.

Per interrompere la trasmissione del morbillo, e mantenere l'eliminazione, sono necessarie coperture vaccinali (CV) $\geq 95\%$ per due dosi di vaccino MPR. In Italia gli ultimi dati di CV disponibili sono relativi al 2022 e indicano, a livello nazionale, una CV pari al 94,4% per la prima dose di vaccino nei bambini di 24 mesi di età, e una CV pari a 85,1% per la seconda dose a 5-6 anni di età. Esistono variazioni tra le Regioni, con un range, per la prima dose, da 76,2% a 97,8%, e per la seconda dose a 5-6 anni, da 72,6% a 93,2%. Oltre a misure per aumentare le CV per la prima e seconda dose in età pediatrica, è essenziale fornire delle opportunità di vaccinazione contro il morbillo agli adolescenti e adulti non vaccinati o incompletamente vaccinati e che non hanno mai avuto la malattia.

Link utili

- Situazione del morbillo e della rosolia in Europa e nel mondo:
 - World Health Organization. EpiData.
<https://www.who.int/europe/publications/m/item/epidata-7-2024>
 - Measles and rubella monthly update - WHO European Region - July 2024.
https://cdn.who.int/media/docs/librariesprovider2/euro-health-topics/vaccines-and-immunization/eur_mr_monthly_update_en_july-2024.pdf?sfvrsn=e84d2c64_4&download=true
 - European Centre for Disease Prevention and Control. Measles on the rise in the EU/EEA: considerations for public health response. 16 February 2024. Stockholm: ECDC; 2024.
<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/measles-eu-threat-assessment-brief-february-2024.pdf>
 - European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Monthly measles and rubella monitoring.
<https://ecdc.europa.eu/en/rubella/surveillance-and-disease-data/monthly-measles-rubella-monitoring-reports>
- Coperture vaccinali:
 - Ministero della Salute. Coperture vaccinali per le vaccinazioni dell'età pediatrica e dell'adolescenza.
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1_1.jsp?lingua=italiano&id=38

Il Bollettino riporta i risultati del Sistema di Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia aggiornati al mese precedente alla sua pubblicazione. I dati presentati sono provvisori, visto che alcuni casi potrebbero essere riclassificati in seguito all'aggiornamento delle informazioni disponibili.

Si ringraziano i referenti della sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia presso le Regioni e le Asl, e i medici che hanno segnalato i casi.

Si ringraziano i Laboratori Regionali appartenenti alla Rete Nazionale Dei Laboratori Di Riferimento per Morbillo e la Rosolia MoRoNet per la conferma dei casi.

Referenti sorveglianza integrata morbillo-rosolia presso l'Istituto Superiore di Sanità.

- *Reparto Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici, Dipartimento Malattie Infettive: Antonino Bella, Martina Del Manso, Daniele Petrone, Patrizio Pezzotti, Antonietta Filia.*
- *Laboratorio di Riferimento Nazionale, Dipartimento Malattie Infettive: Melissa Baggieri, Antonella Marchi, Paola Bucci, Silvia Gioacchini, Fabio Magurano.*